



# SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

## RETRACTION PASTE

### INSTRUCTIONS FOR USE

**STORE THIS PRODUCT IN A COOL, DRY PLACE**  
Refrigeration will prolong shelf life, but avoid freezing. Bring to room temperature before use.

**PRODUCT DESCRIPTION**  
Simplee Retraction Paste is a dental product capable of temporarily controlling gingival bleeding, displacing marginal gingiva and drying the gingival sulci around a tooth.

The pastes allow the dental clinician to perform operative procedures without interference from blood, moisture or hyperplastic soft tissue.

Simplee Retraction Paste is supplied in:

In 0.24 gram single-patient use, unit dose capsules, designed for use with a compatible dispensing gun.

**INDICATIONS FOR USE**  
Simplee Retraction Paste is indicated for temporary retraction and hemostasis of the marginal gingival tissues during clinical procedures such as taking subgingival and per gingival dental impressions, seating of fixed prostheses, and restorative dentistry.

**CONTRAINDICATIONS FOR USE**  
Simplee Retraction Paste should not be swallowed, and is contraindicated for use on or by persons who are allergic to or sensitive to aluminum chloride, silicones or similar products. Symptoms may include dermatitis or inflammatory reactions. If this occurs, discontinue use and obtain medical care immediately. The product should not be used in the presence of, and is not a treatment for, active periodontal disease.

**PRECAUTIONS FOR USE**  
• Simplee Retraction Paste should be used in gingival sulci above the level of the junctional epithelium.  
• The tip of the unit dose capsule should be held at the mouth of the sulcus, without actually entering into it. The paste should be expressed slowly into the sulcus, until no residue remains in the gingival sulcus.  
• After the material has been in the sulcus for approximately 2 minutes, it must be completely removed. The sulcus should be thoroughly rinsed with water and inspected for residual material so none is left behind on the gingiva or the tooth surface.

**PRODUCT WARNINGS AND CLINICAL INFORMATION**  
• Store Simplee Retraction Paste in a cool dark place prior to use, sealed in the foil package.

• Unit dose capsules are single-patient use only, and should be discarded after use.

• Avoid sunlight or nearby heat sources. Shelf life will be reduced if not stored properly.

• Simplee Retraction Paste, like many agents used in dentistry to control bleeding, contains Aluminum Chloride. This may cause corrosion on some plastic or metal surfaces (even stainless steel). If left in extended contact, To protect dental instruments, always remember to rinse off Simplee Retraction Paste from their surface immediately after each use.

• If product accidentally contacts skin or eyes, wash with copious amounts of water. Obtain medical care immediately if necessary.

• Do not ingest this product, and keep it away from children.

**GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE**  
1. After tooth preparation is complete, rinse the sulcus with water. Gently dry with compressed air at an angle to the open sulcus, not directly into it.

2. Open the resealable foil package by tearing off the top where indicated. Save the bag for later storage. Remove a unit dose capsule from the package.

3. By using a unit dose capsule, insert it properly into a compatible gun, remove the cap and "start" the flow by extruding a small amount onto a pad first. It is recommended that a barrier bag is used with the compatible gun.

4. Express Simplee Retraction Paste around the tooth into the mouth of the gingival sulcus, until it is slightly overfilled with material. Do not force the capsule into the tissues. Allow the material to remain undisturbed in the sulcus for 2 minutes.

5. To increase gingival retraction, pre-made cotton compression caps (or standard cotton rolls cut into short sections) may be placed over the tooth, followed by 2 minutes of biting pressure by the patient's opposing teeth.

6. Simplee Retraction Paste remains pliable, and does not fully dry out in the sulcus. After 2 minutes, rinse it away with water and air and remove

any remaining material using a non-cutting hand instrument or cotton pledge. Rinse and dry again. The sulcus is now ready for the impression or restorative procedure.

8. Unit dose capsules are for single-use on one patient only. Each time Simplee Retraction Paste is used on a different patient, apply a new unit dose capsule.

11. If you have any questions, call 1-800-243-7446 or e-mail info@parkell.com.

TIPS FOR DENTAL PRACTITIONERS

The following information should help dental practitioners reduce the risk of cross-contamination between patients when using multiple-use dental dispensers: apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers; utilize multiple-use dental dispensers before use with each patient; use new, uncontaminated gloves when handling multiple-use dental dispensers;

utilize dental assistants to dispose material for the dentist; avoid contact of the reusable parts (e.g., the body of the multiple-use dental dispenser) with the patient's mouth; do not reuse the multiple-use dental dispenser if it becomes contaminated; do not reprocess a contaminated multiple-use dental dispenser by using chemical wipes or disinfectants; do not immerse multiple-use dental dispensers in a high level chemical disinfectant, as this may damage the dispenser and the material contained in the device; do not sterilize multiple-use dental dispensers, as this may damage the material contained in the device.

**DISPOSAL:**  
Dispose of the product in accordance with local regulations.

**EVENTS:**  
Reportable incidences should be reported to Parkell and the competent authority in which the user and/or patient is established.

**WARRANTY AND TERMS OF USE**  
For full warranty and Terms of Use information, please see [www.parkell.com](http://www.parkell.com). Safety Data Sheets (SDS) are available at [www.parkell.com](http://www.parkell.com). Parkell's Quality System is certified to ISO 13485.

**AVAILABLE PRODUCTS**  
Simplee Retractionpaste Capsules — (30) unit dose capsules [0.24g/capsule]

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**PRODUKT TROCKEN UND KÜHL LAGERN.**

Durch Kühlung wird die Haltbarkeit verlängert. Einfrieren ist aber zu vermeiden. Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

**PRODUKTBESCHREIBUNG**  
Die hämostatische Gingiva-Retraktionspaste von Simplee ist ein Dentalprodukt zur vorübergehenden Kontrolle von Zahnläsionsblutungen, Verdrängung der marginalen Gingiva und Trocknung des Sulcus um einen Zahn. Die Pasten ermöglichen den Kontakt zwischen Zahnschmelz und dem gingivalen Gewebe.

Die Simplee Retraction Paste ist in folgender Form erhältlich: Einzelzold-Kapseln, grün 0.24-g. Einzelzold-Kapseln für den Gebrauch mit einem Patienten werden zur Verwendung für die Praxis bereitgestellt.

**INDICATIONS FOR USE**  
Simplee Retraction Paste ist für temporäre Reaktion und Hämostase der marginalen gingivalen Tissue während klinischer Prozeduren wie Zahntaking subgingival und per gingivalen dentalen Impressionen, Sitzung von festen Prothesen, und restorativer Zahnmedizin.

**CONTRAINDICATIONS FOR USE**  
Simplee Retraction Paste sollte nicht schlucken, und ist kontraindiziert für den Gebrauch von Personen, die Allergie oder Sensitivität gegenüber Aluminiumchlorid, Silikaten oder ähnlichen Produkten haben. Symptome können Dermatitis oder entzündliche Reaktionen sein. Wenn dies auftritt, sollte die Verwendung sofort aufgegeben werden und ärztliche Hilfe eingeholt werden.

**PRECAUTIONS FOR USE**  
• Simplee Retraction Paste sollte nur in gingivalen Sulci über der Epithelgrenze eingesetzt werden.  
• Das Ende der unit dose capsule sollte nicht in den Mund gebracht werden, sondern sollte direkt in den Sulcus eingesetzt werden.  
• Nach der Verwendung sollte die Paste im Sulcus für ca. 2 Minuten belassen, bis sie vollständig entfernt ist. Die Sulcus sollte gründlich mit Wasser gespült und nach der Entfernung sollte kein Residualmaterial zurückbleiben.

**INFORMATIONEN**  
Simplee Retraction Paste ist indiziert für die vorübergehende Retraktion. Die Paste sollte längstens in den Sulcus gebracht werden, um das Material nicht mit dem gingivalen Gewebe zu kontaktieren.

• Nachdem das Material etwa 2 Minuten lang im Sulcus war, muss es vollständig entfernt werden. Der Sulcus sollte gründlich mit Wasser gespült und das Material wieder hergestellt werden, damit kein Material auf Gingiva oder Zahnhilfplatte zurückbleibt.

**DESCRIPTION DU PRODUIT**  
La pâte de rétraction hémostatique gingivale de Simplee est un produit dentaire permettant de contrôler temporairement le saignement gingival pour faciliter la prise d'impressions dentaires ou la réalisation de protéoses.

**MODE D'EMPLOI**

**STOCKER CE PRODUIT DANS UN LIEU FRAIS ET SEC.**

Le stockage de Retraction Paste est indiqué pour la rétraction provisoire. La pâte doit être conservée dans un endroit frais et sec.

**DISPONIBILITÉ DU PRODUIT**

La pâte de rétraction gingivale de Simplee est un produit dentaire permettant de contrôler temporairement le saignement gingival pour faciliter la prise d'impressions dentaires ou la réalisation de protéoses.

**PRÉVENTIONNÍ OPATŘENÍ**

Retraktorična pasta Simplee je namenjena za privremeno spremanje gingivale, da omogoči delavcu za izdelavo zubačnih modelov ali za izdelavo protetike.

**ARTALMALTANLITIS**

A Simplee retraktorična pasta je namenjena za privremeno spremanje gingivale, da omogoči delavcu za izdelavo zubačnih modelov ali za izdelavo protetike.

**INSTRUZIONI GENERALI PER L'USO**

1. Dopo aver terminato la preparazione del dente, risciacquare il solco con acqua. Agire delicatamente con una compressa dirigendo il getto di aria verso l'apertura del solco.

2. Aprire la confezione in pellicola risigillabile e stendere la pâte sulla linea prefissata del solco.

3. Inserire correttamente la capsula monodose in un applicatore compatibile e rimuovere il "cappello" e "avviare" l'erogazione estrudendo la pâte di retronzione.

4. Estrarre la pasta per retrazione gingivale Simplee dal cavo orale, intorno al dente nel solco gingivale, finché la pasta non deborda leggermente dal solco.

5. Evitare il contatto della pasta con la gengiva o la superficie dentaria.

6. Non utilizzare le applicazioni dentali cariela perché possono causare irritazioni.

7. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

8. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

9. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

10. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

11. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

12. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

13. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

14. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

15. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

16. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

17. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

18. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

19. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

20. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

21. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

22. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

23. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

24. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

25. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

26. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

27. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

28. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

29. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

30. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

31. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

32. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

33. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

34. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

35. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

36. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

37. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

38. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

39. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

40. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

41. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

42. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

43. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

44. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

45. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

46. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

47. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

48. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

49. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

50. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

51. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

52. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

53. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

54. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

55. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

56. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

57. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

58. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

59. Non utilizzare la pasta per retrazione gingivale Simplee se non è stata inserita correttamente.

60. Non utilizzare la pasta per retrazione

reprosesser en kontaminert dentaldispenser til flegangsbruk ved hjelp av kjemiske tørkeservietter eller desinfeksjonsmiddel; ikke legg dentaldispenser til flegangsbruk ned i høyeffektivt desinfeksjonsmiddel, da dette kan skade dispenserne og materialene som befinner seg i enheten; ikke steriliser dentaldispensere til flegangsbruk, da dette kan skade materialene som befinner seg i enheten.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Produktet skal avfallshåndteres i samsvar med lokale forskrifter

#### HÅNDTERING

Rapportpliktige hendelser skal rapporteres til Parkell og kompetent myndighet på stedet hvor bruker og/eller pasient har sitt faste oppholdsted.

#### GARANTI

Rett til full garanti og alle bruksvilkår vennligst besøk [www.parkell.com](http://www.parkell.com). Parkells kvalitetskontrollsystem er certifisert iht. EN-ISO 13485.

#### TILGJENGELIGE PRODUKT

**Simplee Retraction Paste kapsler –**  
(30) engangsdose kapsler (0,24g/kapsel)

#### • KÄYTÖÖHJE

**SÄILYTTÄ TUOTETTA VILLEÄSSÄ JA KUIVASSA PAIKKASA.**  
Säilytämisen jälkeäpäissä pidätää käytölköitä, mutta päämyöntää on välttämätöntä.

**TOUKEUTTUVAUS**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

**YHDELLÄ KÄYTÖÖHJÄ**  
Simplee Retraction-paste hemostatitien ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienviennuuden hampaan ympäri. Pastat heijastavat hammaslääkareiden työskentelyä leikkauksineen ja pitävät hammaslääketieteellistä veren, kosteuden ja hyperplastiin pehmeyksikseen.

5. Ikenen retraktiota voidaan lisätä asettamalla valmitti vanupurustuskappaleet (tai tavaramaiset). Lyhytksi kappaleksi leikatut vanurullat) hamppa pääle, minäkä jälkeen pölytä vanusta vastakkaisia hamppia yhteen 2 minuuttia.

6. Simplee Retraction-paste pystyy nekoaneen eikä kuivu kokonaan ientaskussa. Huuhete se vedellä ja ilmalla 2 minuutin kuluttua, ja pojista mahdollisesti jäljelle jäänyt materiaali tylpällä käsistäinilla tai vanupullolla. Huuhete ja kuivaa uudelleen. Lentasuk on nyt valmis ja koskevan ottoa tai korjaavaa toimenpiteitä varten.

7. Kerta-annospaskalit on tarkoitettu keräytiltä ainaa ostaan ja pölytäillä.

8. Undlad at lindage dette produkt, og hold det væk fra børn.

9. Generell retronkappe pasti i enne käytön tarkoituksena.

10. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

11. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

12. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

13. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

14. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

15. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

16. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

17. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

18. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

19. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

20. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

21. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

22. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

23. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

24. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

25. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

26. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

27. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

28. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

29. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

30. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

31. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

32. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

33. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

34. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

35. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

36. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

37. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

38. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

39. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

40. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

41. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

42. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

43. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

44. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

45. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

46. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

47. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

48. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

49. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

50. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

51. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

52. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

53. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

54. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

55. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

56. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

57. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

58. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

59. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

60. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

61. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

62. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

63. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

64. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

65. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

66. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

67. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

68. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

69. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.

70. Käytä annospaskalit vähintään 2 minuutin sisällä.